

شپش سر علاوه بر زندگی در میان موهای سر در ابرو، مژه‌ها و سبیل نیز یافت می‌شوند. هیزان آنودگی به شپش سر به طول هو پستگی ندارد.



انتشار شپش سر هم مانند شپش بدن فقط از طریق تماس نزدیک افراد می‌باشد. آنودگی می‌تواند در اماکن پرجمعیت مانند مدارس، خوابگاه‌ها از طریق تماس‌های نزدیک افراد با یکدیگر اتفاق افتد. همچنین این نوع شپش ممکن است با استفاده از شانه افراد دیگر که موی آنوده به رشک یا شپش به آن چسبیده است انتشار یابد.

روش‌های کنترل و پیشگیری شپش سر

- شستشوی مرتب سر با آب گرم و شامپو، تعداد شپش را در موها کاهش می‌دهد ولی بر تخم‌هایی که محکم به پایه مو چسبیده‌اند اثری ندارد.
- شانه زدن مرتب موها با استفاده از شانه‌های مخصوص شپش که دندانه‌های ریزی دارند، می‌تواند شپش و رشک‌ها را از مو جدا کنند.
- شانه کردن مرتب موها با استفاده از شانه‌های معمولی رشک را از مو جدا نمی‌کنند ولی تعداد شپش‌های بالغ و نمف را کاهش می‌دهد.
- معمولاً ترکیبات شیمیایی نمی‌توانند تخم‌های شپش را که به موی سر چسبیده‌اند جدا نمایند.

خواب، حolle و لباس یا به وسیله نشستن روی صندلی‌های آنوده، مبل یا بالش انتقال یابد.

روش کنترل و پیشگیری

- بهترین راه برای ریشه کنی شپش بدن در یک فرد آنوده:
- ۱ - تعویض لباس‌ها، نشستن لباس‌ها در حرارت بیش از ۶۰ درجه سانتی گراد ترجیحاً اطونمودن آن‌ها است. با قرار دادن لباس‌های آنوده در دمای ذکر شده به مدت ۳۰ دقیقه تخم‌ها و شپش‌ها از بین می‌روند.
 - ۲ - ملحقه افراد آنوده با پد شسته شود و با حرارت خشک گردد (استفاده از نور آفتاب و ترجیحاً اطوکشی شود)
 - ۳ - افراد آنوده در طول درمان و بعد از استفاده ای شپش کش‌ها باید لباس تمیز بپوشند.

این روش‌ها بعد از ۱۰ روز به منظور کشتن شپش‌هایی که بعد از درمان اولیه از تخم‌ها خارج شده‌اند باید تکرار شود.

شپش سر

دوره زندگی شپش سر شباهت زیادی به شپش بدن دارد ولی تخم‌ها (رشک‌ها) روی لباس گذاشته نمی‌شوند، بلکه با یک ماده شیمیایی به پایه موهای سر خصوصاً موهای عقب، بالای گوش و پشت گردن می‌چسبند. شپش سر علاوه بر زندگی در میان موهای سر در ابرو، مژه‌ها و سبیل نیز یافت می‌شوند. میزان آنودگی به شپش سر به طول مو پستگی ندارد.

شپش

شپش‌ها حشراتی هستند کوچک و بدون بال با دگردیسی ناقص که به راسته آنپلورا تعلق دارند. سه گونه از شپش‌ها به عنوان انگل‌های خارجی اجباری و خونخوار انسان را آنوده می‌کند:

شپش بدن، شپش سر، شپشک عانه

هر سه گونه شپش انتشار جهانی دارند و غالباً در مناطق معتدله بیشتر یافت می‌شوند. شپش در روز چند بار تقدیه می‌کند و ممکن است در آنودگی شدید باعث تحریک و خارش زیادی شود. واکنش‌های سمی به بزاق تزریق شده شپش در پوست ممکن است به خستگی و ضعف عمومی منجر شود.

شپش بدن

شپش بدن معمولاً در لباس به ویژه جایی که با بدن در تماس مستقیم است یافت می‌شود. به عنوان مثال در فاق شلوار، زیر بغل، کمر لباس، یقه و شانه وجود دارند. این شپش‌ها فقط در زمان تقدیه خود را به موها می‌چسبانند.

راه انتشار

شپش بدن از طریق تماس نزدیک افراد با همیگر انتشار می‌یابد. خصوصاً در جوامعی که تراکم جمعیت زیاد است، شیوع بالایی می‌تواند داشته باشد. آنودگی به شپش بدن ممکن است از طریق استفاده مشترک از وسایل

شیش انگل اجباری انسان است لذا جهت کنترل آن اقدام اساسی باید برروی بدن میزبان و سایر در تماس با پوست و مو متتمرکز شود.



روش‌های کنترل بیماری

- ۱ - اصولاً بهترین روش مبارزه با شیشک عانه شامل حذف موهای آلوده به شیشک (موهای زائد ناحیه شرمگاهی) از بدن است.
- ۲ - استفاده از امولسیون و لوسيون حشره‌کش‌ها جایگزین روش قبلی
- ۳ - استفاده از حشره‌کش‌ها (به علت حساسیت ناحیه تناصلی، بعضی از حشره‌کش‌ها ممکن است باعث تحریک، تورم یا آماس پوست شود. در چنین موقع بهترین و ساده‌ترین روش درمان حذف موهای زائد این بخش می‌باشد.)

خلاصه اقدامات بهداشتی برای مبارزه با شیش‌های انسانی

الف) شیش سر:

- ❖ رعایت نظافت و بهداشت شخصی
- ❖ کوتاه کردن موها، تا شانه کردن به راحتی انجام شود
- ❖ شستشوی مرتب موها
- ❖ شانه کردن مرتب مو با استفاده از شانه‌های دندانه ریز محکم
- ❖ شستشوی روسربی یا کلاه با آب ۶۰ درجه
- ❖ استفاده از شامپوهای توصیه شده توسط وزارت بهداشت و درمان
- ❖ گرد شیش کش کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد زیرا باعث کدر شدن موها شده و سایرین متوجه آلودگی و کاربرد حشره‌کش می‌شوند.

ب) شیش بدن:

- ❖ رعایت بهداشت شخصی
- ❖ عدم استفاده از وسایل خواب مشترک
- ❖ عدم استفاده از لباس‌های مشترک
- ❖ حمام کردن منظم
- ❖ تنویض لباس‌ها
- ❖ شستشوی لباس‌ها با آب ۶۰ درجه و صابون و اطهار کردن آنها
- ❖ عدم استفاده از لباس‌ها و رختخواب و وسایل آلوهه به مدت یک‌ماه

گردآوری : میترا شادمان
طراحی : منصور عیوبی اینانلو

شیش عانه

تخم‌های شیش به موهای اطراف مقدع می‌چسبد. مانند شیش سر چندین تخم ممکن است روی یک مو گذاشته شود. شیش عانه ممکن است در نقاط دیگری از بدن که موهای زبر و کم پشتی دارند مثل ریش، سینه، مژه و موهای زیر بغل و گاهی اوقات سینه و به ندرت سر یافت شوند.

راه‌های انتقال

- ۱ - آلودگی به شیشک عانه معمولاً از طریق تماس جنسی صورت می‌گیرد.
- ۲ - کودکانی که با والدین خود می‌خوابند تماس با والدین می‌تواند آنها را به شیشک عانه مبتلا سازد.
- ۳ - آلودگی از لباس دور انداخته، ملأه آلوهه و به ندرت نشمنی گاه تواله‌های فرهنگی نیز ناشی می‌شود. هرگاه ماده‌های این شیشک از انسان جدا شدن، فقط تا دو روز قادرند زنده بمانند.

